

Apistogramma baenschi

Geschreven door: aqua-life

Achtergrond

Familie, orde en klasse

Familie: Cichlidae

Orde: Perciformes

Klasse: Actinopterygii

Vindplaats

Deze vis is in Zuid-Amerika in de natuur te vinden. Vooral in Peru komen ze veel voor.

Waterwaarden

De pH-waarde moet rond de 6, liggen en de gH-waarde tussen de 2 en de 10.

Temperatuur

Een goede temperatuur voor deze vis licht rond de 26 graden Celsius.

Grootte

De mannetjes worden ongeveer 6cm lang en de vrouwtjes 4,5cm lang.

Uiterlijke kenmerken

De kop van het mannetje is geel en de rest van het lijf is blauw met zwarte verticale strepen over het lichaam. Het vrouwtje geheel geel, heeft korte vinnen heeft, net als het mannetje, zwarte verticale strepen. Deze zijn echter alleen net zo duidelijk te zien in de broedtijd.

Geslachtsonderscheid

De geslachtsonderscheid is goed te zien. Het mannetje heeft namelijk een langgerekte rugvin, een mooie rode krans in de staartvin. Het vrouwtje heeft korte vinnen en is helemaal geel gekleurd.

Gedrag

Algemeen gedrag

Het is een rustige, vreedzame soort die niet agressief is tegen zijn medebewoners. Zorg voor voldoende schuilplaatsen, dan is dit visje helemaal niet schuw.

Gedrag in relatie tot soortgenoten

Deze vis kan het beste gehouden worden in een koppel. Als er 2 mannetjes in een te klein aquarium zitten kunnen er problemen ontstaan.

Gedrag in relatie tot andere soorten

Vreedzaam. Alleen in de broedperiode word er agressief opgetreden tegen de medebewoners om het nest te beschermen.

Voedsel

Voedselbehoefte van nature

De Apistogramma baenschi leeft op de bodem van de Rio Shanusi in Peru. Deze rivier wit zand op de bodem met daarop een laag bladstrooisel waarin deze vis zich schuil houdt en voortplant. Ook zijn tussen deze bladeren voldoende prooidiertjes te vinden.

Voedsel in aquaria

Als voedsel kan diepvries en levend voer gegeven worden. Denk dan aan muggenlarven, mysisgarnaaltjes, artemia's, cyclops, bosmieden en daphnia. Ook droogvoer wordt geaccepteerd, maar zorg wel voor een gevarieerd dieet.

Kweek

Alles over het kweken in het aquarium

Voor een goede kweek moet de pH waarde tussen de 5,5 en 6,5 liggen. De eitjes worden gelegd in een hol.

Opkweken van jongbroed

Zodra de larfjes vrij zwemmen kunnen ze worden bijgevoerd met Artemia-Naupliën. Het vrouwtje verzorgt de kroost voor ongeveer 4 weken en daarna moeten de larfjes zichzelf redden.

Links

http://www.dwergcichlide.nl/apistogramma_sp._inka50.htm

<http://www.inibico.org/Discoveries/Apistogrammabaenschi/tabid/45/Default.aspx>

<http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=62348>