

Corydoras narcissus

Geschreven door: Mars

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel

Dit artikel wordt geschreven naar aanleiding van 'Raad de vis zijn naam'. Persoonlijk heb ik ervaring met de *C. arcuatus*, het broertje van de *C. narcissus* (de *narcissus* heeft een langere snuit dan de *arcuatus*, voor de rest zijn ze vrijwel identiek).

2. Achtergrond

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam

Cory = helm

Doras = huid

Narcissus komt uit het Grieks (Narkissos), hij is de zoon van de Griekse god van de rivieren Kephissus.

2.2 Beschrijver van de vis

Nijssen & Isbrücker in 1980.

2.3 Familie, orde en klasse

Familie: Callichthyidae (pantsermeervallen)

Orde: Siluriformes (meervalachtigen)

Klasse: Actinopterygii (straalvinnigen)

2.4 Vindplaats

Brazil: Amazone gebied; Rio Humaita, Rio Purus

2.5 Waterwaarden

pH: 6 – 7

2.6 Temperatuur

23 – 25 graden Celsius

2.7 Grootte

Tot 7,5 centimeter, waarbij de mannelijke exemplaren vaak iets kleiner blijven dan de vrouwen.

2.8 Uiterlijke kenmerken

De *C. narcissus* is een Corydorassoort met een blanke kleur. Over de rug loopt vanaf het oog tot de staartaanzet een zwarte streep, aan beide kanten van de rug.

2.9 Geslachtsonderscheid

Mannetjes zijn op volwassen leeftijd kleiner dan vrouwtjes, en vrouwtjes hebben een wat bollere buikpartij dan de mannetjes. Dit is voor een enigszins geoefend oog goed te zien als je de vissen van de zijkant of de bovenkant bekijkt.

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen

De *C. narcissus* is het broertje van de *C. arcuatus*, met als enige verschil dat de snuit van de *C. narcissus* wat langer is (uitsteekt).

2.11 Problemen in leefomgeving

Nnb

2.12 Bouw van de vis

Gelijk aan andere Corydorassoorten.

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen

Een Corydoras heeft buiten de voor vissen normale 'kieuwademhaling' ook een darmademhaling. Dit betekent zoveel als dat de Corydoras eens in de zoveel tijd omhoog schiet naar het wateroppervlak om daar lucht te happen, waarna hij weer terug zakt naar de bodem. Een aquarium kan daarom niet te hoog zijn.

3. Gedrag

3.1 Algemeen gedrag

Corydoras zijn van nature redelijk schuwe dieren. Ze houden niet van te veel licht, omdat het eigenlijk nachtdieren zijn, ook trillingen of abrupte bewegingen zorgen ervoor dat ze met zijn allen wegschieten naar een beschutte plek. Toch zijn ze vaak aan het rondscharrelen door de bak, als deze goed ingericht is, op zoek naar voedsel.

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten

Corydoras zijn scholenvissen, en behoren daarom in schooltjes van minimaal 6 exemplaren gehouden te worden. Hoe meer er echter van dezelfde soort in een aquarium zitten des te actiever zullen ze zijn. Helaas is het vaak zo dat wanneer je meerdere soorten bij elkaar zet dat deze geen gehele school vormen, maar toch soortgenoten opzoekt. Het beste is het dus om zoveel mogelijk Corydoras van dezelfde soort in 1 bak te doen.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten

Corydoras zijn rustige vissen, die geen andere vissen kwaad zullen doen. Het zijn hele nuchtere beestjes die alles maar over zich heen laten komen. In de regel zijn ze niet bang voor andere vissen. Het is zelfs zo dat ze zich weinig aantrekken van bijvoorbeeld een koppel cichliden wat hun nest vrij agressief aan het verdedigen is.

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd

Nnb

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel

Wanneer er voedsel in de bak gegooid wordt is dat een garantie op actie binnen de Corydoraspopulatie. Ze gaan direct rondscharrelend over de grond op zoek naar datgene wat zo lekker ruikt. Als het op eten aankomt zijn ze zeker niet schuw, het gebeurt regelmatig dat een Corydoras op zijn kop hangt om aan hetzelfde pilletje te eten als een grote L-nummer. Hierbij verdwijnt een deel van de Corydoras bijna in de mond van de L-nummer.

4. Voedsel

4.1 Voedselbehoefte van nature

Vooral carnivoor, maar als het in de buurt is zal de Corydoras er niet over twijfelen om ook plantaardig voer te eten. Dit houdt dus in: muggenlarven en andere dierlijk voedsel

4.2 Voedsel in aquaria

Muggenlarven, artemia, daphnia, algentabletten, garnalentabletten.

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in de natuur

In de natuur zetten Corydoras over het algemeen af nadat er een frisse regenbui gevallen is, waardoor het water een paar graden koeler geworden is. Er gaan dan 1 vrouwtje en 2 tot 3 mannetjes een heel paringsritueel uitvoeren, waarbij de mannetjes zich zó proberen te manoeuvreren dat ze zich haaks op het vrouwtje kunnen 'hechten'. Het vrouwtje heeft dan al enige tijd een eitje tussen haar borstvinnen geklemd zitten. De juiste positie verkrijgen lukt maar bij 1 mannetje per eitje. Nadat het mannetje het eitje op die manier bevrucht heeft plakt het vrouwtje het eitje op een vlak oppervlak, zoals een plant, een stuk hout of een steen.

5.2 Alles over het kweken in het aquarium

Om de vissen voor te bereiden op het kweken is het aan te raden ze eerst enige tijd lang te voeren met uitsluitend stevig dierlijk voer (rode mug, zwarte mug, etc). Na het verversen met kraanwater, dat een paar graden koeler is dan het aquariumwater zullen de Corydoras klaar zijn om te paren (de rest gaat hetzelfde als in het wild). Er gaan dan 1 vrouwtje en 2 tot 3 mannetjes een heel paringsritueel uitvoeren, waarbij de mannetjes zich zó proberen te manoeuvreren dat ze zich haaks op het vrouwtje kunnen 'hechten'. Het vrouwtje heeft dan al enige tijd een eitje tussen haar borstvinnen geklemd zitten. De juiste positie verkrijgen lukt maar bij 1 mannetje per eitje. Nadat het mannetje het eitje op die manier bevrucht heeft plakt het vrouwtje het eitje op een vlak oppervlak, meestal een ruit, of een plant, een stuk hout of een steen. Na het afzetten dienen de ouders bij de eieren weggehaald te worden (of andersom).

5.3 Opkweken van jongbroed

Na enkele dagen komen de eieren uit (de tijdsduur is een beetje afhankelijk van de temperatuur waarop de eitjes gehouden worden. Doorgaans geldt dat hoe warmer de eitjes zitten, hoe sneller ze uitkomen). De larven zullen enkele dagen van hun dooierzak leven. Vervolgens moeten ze gevoerd worden met net uitgekomen artemia naupliën of het fijnste infuus (af en toe fijngemalen algentablet of vlokvoer wordt ook op prijs gesteld). De jongen zullen meerdere keren per dag kleine porties gevoerd moeten worden, wel tot 6x per dag. Het is dan ook aan te raden om het kweekbakje dagelijks te verversen en de bodem grondig af te zuigen, in verband met een nitraatoverschot.

6. Conclusie

De Corydoras narcissus is een leuke vis voor in het gezelschaps- of biotoopaquarium. Door hun nieuwsgierige gedrag zijn de visjes een lust voor het oog. Ze zijn vrij gemakkelijk te houden, mits je zorgt dat het aquarium niet te hoog is, in verband met de darmademhaling. Het kweken met de Corydoras is een leuke en dankbare uitdaging. Al met al een echte aanrader.

7. Links

http://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=241

http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Corydoras_narcissus.html

<http://www.scotcat.com/factsheets/narcissus.html>