



Hoe kweek je nu eigenlijk corydoras sterbai?

Door: Daveostrum

Het geslacht

De vrouwen zijn veel groter en dikker en hebben ronde vinnen onder hun buik. De mannetjes zijn veel kleiner, slanker en hebben duidelijk puntigere vinnen onder hun buik.

Het Aquarium

De inrichting van je aquarium is niet echt van belang. Als je kiest voor geen bodem dan kun je makkelijker rommel afhevelen. Maar je Corydoras zullen het zeker waarderen als er wat plantjes en eventueel een stuk kienhout in te vinden is waar ze kunnen schuilen. Zorg dat je een aquarium van rond de 60 á 80 cm hebt zodat je meerdere corydorassen huisvesten en dan is de kans van slagen natuurlijk stukken groter.

Voeren van de ouders

Voordat je een kweek verwacht moet je zorgen dat je ze veel voert met tubifex en tabletten. Als je dat 3 tot 4 weken gedaan hebt ververs dan 80 % van je water. De tubifex moet je eigenlijk maximaal 2 keer per week voeren anders vervuיל je het wat zeer ernstig.

Het voeren van de jonge

De jonge corydorassen kunnen groot gebracht worden met liquifry en stofvoer. Ook worden de meeste jonge gevoerd met artemia. Uiteindelijk kun je deze vooral grootbrengen met tabletten.

Wat als er eieren zijn

Je kunt er voor kiezen om de ouders te verwijderen zodra je eitjes hebt. Maar een naar mijn mening betere keuze is om de eieren over te zetten naar een ander klein aquarium. Je kunt dit doen door de eitjes voorzichtig met je vinger eraf te rollen. De ouders eten de eieren anders graag op. Zodra je jongen hebt is het van belang dat je een panty om de filter doet om te voorkomen dat de jonge daar in terecht komen. Ook is van belang dat je veel water ververst dit zorgt voor een goede doorgroei van je jongen. Dit mag best 2 á 3 maal per week 50% zijn. In de opfok bak is het verstandig om geen bodem te gebruiken dit voorkomt vaak het beschimmelen van de eieren.

Het is vaak raadzaam om te zorgen dat je een antischimmelmiddel in huis hebt.

De temperatuur

25 á 26 graden Celsius. Als je water ververst mag dat best 2 á 3 graden kouder zijn. Let op bij de jonge Cory's zorgen voor zo weinig mogelijk temperatuur verschil hier kunnen ze gevoelig op reageren.

Het water

Het water kan gewoon leidingwater zijn. ph 7 a 8. Beukenbladen of amandelblad kan beschimmeling van de eieren voorkomen.