

malpulutta kretseri

Geschreven door: fctwente

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel

naar aanleiding van raad de vis zijn naamspel wilde ik wel een artikel schrijven.

2. Achtergrond

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam

(mapulutta kretseri deraniyagala) de soortnaam komt uit het in sri lanka gesproken singalees "'mal" betekent "bloem" en pulutta staat voor belontia signata," de naam malpulutta kretseri betekent eigenlijk "bloemen-belontia," de soort is verder benoemd naar zijn ontdekker de heer de kretser een sri lankaanse advocaat die het visje in 1937 vond en hem door deraniyagala heeft laten determineren.

2.2 Beschrijver van de vis de kretser 1937

2.3 Familie, orde en klasse

Familie:osphronemidae (echte goeramis-subfamilie macropodusinae

Orde: perciformes (baarsachtigen)

Klasse: actinopterygii(straalvinnigen)

2.4 Vindplaats

dandegamuva,nikvaratiya,hettipola,sabaragamuva,kottawa-forrest; sri lanka

2.5 Waterwaarden ph 6 tot 7 dgh 1-5

2.6 Temperatuur varierend van 23 tot 27 graden.

2.7 Grootte mannetjes 7 cm vrouwtjes 4 cm

2.8 Uiterlijke kenmerken smalle vis met mooie lange vinnen

2.9 Geslachtsonderscheid mannetjes zijn een stuk groter en hebben een enorm verlengde staartvin ook de rugvin is vrij langgerekt.

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen de goerami is er familie van.

2.11 Problemen in leefomgeving nmb

2.12 Bouw van de vis smalle vis met mooie lange vinnen en stippen

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen gevoelig voor te hoge nitriet-nitraat

3. Gedrag

3.1 Algemeen gedrag

een zeer interessante vis om te zien vooral de kweek

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten

onder elkaar redelijk vredelievend het is een nieuwsgierig en schuw visje dat eerst de kat uit de boom kijkt maar later zal zijn schuwheid enigzins verminderen.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten

deze soort kunt u het beste in een speciaal aquarium houden met een zwakke verlichting, samen met een paar algeneters.

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd

nmb

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel

redelijk rustig

4. Voedsel

4.1 Voedselbehoefte van nature

nmb

4.2 Voedsel in aquaria

levend voer o.a. rode-zwarte-witte muggenlarven, watervlooien, cyclops, diepvriesvoer wordt ook gegeten "MAAR" beslist geen droogvoer ook het proberen hiervan kan men achterwege laten.

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in de natuur

nmb

5.2 Alles over het kweken in het aquarium

om de vissen te kweken moet men een aquarium inrichten met stenen boomwortels cryptocoryne en moet men een broedhol maken van bv halve cocosnootschalen of een omgekeerde bloempot, de soort is niet zo moeilijk te kweken het belangrijkste is rust rust en nog eens rust... de malpulutta kretseri is een holenbroeder. deze vis heeft een bijzonder paringsritueel het mannetje is veel in het broedhol (schuimnest) bezig om alles in orde te maken, het vrouwtje zoekt de man op indien zij bereid is, hierbij krijgt ze een egale rood tot lichtbruine kleur over haar hele lichaam er is dan ook een witte streep zichtbaar van de bovenkant van de bek tot aan de staart (zoals ook te zien is bij afzettingsbereide betta) de man komt met uitgespreide vinnen uit het hol en balts met de vrouw waarbij ze langzaam om elkaar heen draaien, de vrouw tuit dan haar bek en stoot hard tegen de kieuwen van de man zodat het lijkt of ze zoenen, dan zwemt de man het hol in waarna de vrouw hem volgt "de paring lijkt veel op die van "parosphromenus deissneri ook wat eiergrootte betreft; de man omstrengeld u-vormig het dan s-vormige vrouwtje zonder haar daarbij om te keren. het bijzondere is dat bij deze soort niet het vrouwtje maar de man in een lange paringsverstarring raakt, de man blijft zo, n 45-50 seconden terwijl de vrouw zo, n 30 seconden later ontwaakt, zij begint dan ook gelijk de eieren in het nest te leggen terwijl het mannetje naar de bodem zinkt vallen er diverse eieren op de staart van de man die het vrouwtje makkelijk kan oppakken en naar het hol brengt, het totale afzetten duurt ongeveer anderhalf uur" waarna de man het vrouwtje verjaagd; mannen verzorgen hun broed pijnlijk goed ze laten het zowat geen moment alleen en zorgen steeds voor een schoon nest en hergroeperen veel de eieren en later de uitgekomen jongen "de eieren komen bij een temperatuur van 25-26 graden na ongeveer 48 uur uit.

5.3 Opkweken van jongbroed

de jongen kunnen met vers gekweekte artemia naupli groot worden gebracht.

6. Conclusie

het zijn zeldzame visjes die je hier en daar nog wel eens tegen komt, vooral de kweek is schitterend om te volgen.

7. Links

<http://aquaworld.netfirms.com>

<http://ignl.netfirms.com>